

CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO LE ZANZARE Territorio Comunale di Cento (Fe)

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DELLE COMPRESSE ANTILARVALI

- L'insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, si utilizza esclusivamente in acque stagnanti o a lento deflusso ove vengono deposte le uova dell'insetto, quali tombini, caditoie, bocche di lupo e depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, bacinelle, ecc.
- Prima dell'inizio dei trattamenti nei tombini, nelle caditoie e bocche di lupo, pulire l'interno dalla presenza di fango, foglie ed altri detriti.
- Prima del trattamento a mezzo di compresse, accertarsi che il tombino contenga una certa quantità d'acqua: solo in questo caso inserire la compressa insetticida che sciogliendosi nell'acqua renderà efficace il trattamento.
- La dose consigliata è di una compressa in ristagni di circa 40 litri ogni 2-3 settimane. Tale operazione deve essere eseguita a partire dal mese di aprile e proseguita sino alla fine del mese di ottobre circa. In caso di intense precipitazioni, riduco il periodo di copertura.
- Si invita a divulgare ai vicini di casa le informazioni sulle azioni da intraprendere per evitare la proliferazione della zanzara tigre e zanzara comune.
- Ricordarsi prima della partenza per le vacanze, di mettere al riparo dalle piogge tutti i possibili contenitori d'acqua e di dare a persona di fiducia l'incarico di proseguire i trattamenti sino al rientro dalle vacanze.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

- L'insetticida antilarvale, non deve essere utilizzato per la nebulizzazione in aree a verde contro le zanzare adulte
- Le compresse non devono essere assolutamente rimosse dalla confezione originale. Una volta aperta la confezione, essa deve essere richiusa su se stessa e conservata lontana dalla portata dei bambini
- **NON CONSERVARE LA CONFEZIONE ASSIEME AI MEDICINALI**
- **NON CONSERVARE VICINO AD ALIMENTI DI ALCUN GENERE**
- **PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE**